Rapport ~~68.~~ nº 33.

Sur une observation envoyé à l'academie par monsieur davy chervi mtre en chirurgie à Sablé dont le sujet est une cure obtenue par le retranchement de l'extremité inferieure du tibia dans une luxation du pied.

Dans cette observation mr. davy chervi dit que la luxation etoit complette en dedans, avec rupture des ligaments de la capsule et de la peau, que le tibia passoit à travers les tegumens, et que la femme à qui elle etoit arrivée, etant seule, avait eté obligée de marcher une ~~deux~~ demye Lieue à l'aide d'un bâton pour se rendre chez elle, un chirurgien appellé, en premier reduisit, La luxation et appliqua le Bandage.

Les accidens ne tarderent pas à se manifester, dit il, et Le septiesme, jour, les convultions, L'odeur cadavreuse du pied et La mort prochaine de la malade determinerent Le chirurgien et les parents, à appeller mr. davy chervy;

à cette epoque le pied et une partie de la jambe etaient tumefiés et tres douloureux, L'extremité inferieure du tibia passait à travers la peau, et la surface cartilagineuse etoit ulcerée dans quelques points: monsieur davy cherry fit de legers tantatives pour faire la Reduction, mais ne pouvant L'obtenir, il appliqua un cataplasme emolient, et mit le Bandage a 18. chefs.

La tumefaction de la partie etant diminuée mr. davy cherrie, fit la Reduction, mais quelques moyens quil —

ARC 41 nº 28

employât pour maintenir le tibia en place, il le trouvait toujours a chaque pansement passant à travers les tegumens.

mr. davy chevri prit donc le parti de retrancher avec la scie la portion du tibia qui servait a l'articulation du pied et qui faisait saillie ; ensuite il reduisit et mit le pied dans un etat de flexion, afin que l'astragal correspondant avec le tibia, la reunion pût s'en faire aisement.

Le pansement ne consista que dans l'application de la charpie seche et d'un cataplasme par dessus. — abandonnant le reste, dit l'autheur, aux soins de la nature, j'obtins par cette conduite une parfaite reunion, dans l'espace de deux mois et demi, sans suppuration abondante ni exfoliation apparente.

enfin mr. davy chevri, dit que la cicatrice s'est bien faite, et qu'elle est bien ferme, que la femme marche sans douleur et sans tuméfaction du pied, et que la claudication est tres peu sensible

Cette observation est sans doute interessante — puisqu'elle demontre que dans les luxations semblables — à celle dont il s'agit ici, il n'en faut pas venir aussi promptement à l'amputation de la jambe ainsi que mr. petit le prescrit dans son traité des maladies des os, — mais elle le devient encore d'avantage en ce qu'elle confirme que la résection de l'extremité inferieure du tibia peut se faire avec le même succès que celle d'une portion

de l'humerus ou du Radius: d'ou je pense que Lacademie doit recuillir Soigneusement cette observation pour en faire l'usage qu'elle jugera à propos, et qu'il convient, d'addresser des remerciment à monsieur davy chevrye, en l'exhortant à luy ~~[illegible]~~ communiquer tout ce que sa pratique le mettra à portée d'observer.

à l'academie le 17 juillet 1788 gratereau

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE